

ОЦЕНОЧНЫЙ  
ПЕРЕЧЕНЬ  
СИМПТОМОВ  
И ГЛОССАРИЙ  
ДЛЯ ПСИХИЧЕСКИХ  
РАССТРОЙСТВ

Подготовлено докторами

A. JANCA, Dr T. B. USTUN, Dr J. van DRIMMELEN,  
Dr V. DITTMANN and Dr M. ISAAC



**ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК**  
**DR. M. RITSNER**  
**DR. A. PONIZOVSKI**

**ISBN 5-304-01603-7**

**Всемирная организация здравоохранения**  
**Россия, Санкт-Петербург, Издательство «ОВЕРЛАЙД», 1994**

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ . . . . .	3
Применение . . . . .	4
Титульный лист . . . . .	5
Face sheet . . . . .	6
Screeper (скринер) . . . . .	7
Модуль F0/F1 . . . . .	8
Модуль F2/F3 . . . . .	11
Модуль F4/F5 . . . . .	16
Модуль F4/F6 . . . . .	19

## ВВЕДЕНИЕ

Оценочный перечень симптомов МКБ-10 для психических расстройств является полуструктурированным инструментом для клинической оценки психических симптомов и синдромов категорий F0—F6 международной классификации болезней 10-го пересмотра и состоит из титульного листа, скринера и модулей. В перечень включены следующие модули:

- а) F0/F1 модуль: органические психические синдромы и синдромы при использовании психоактивных веществ;
- б) F2/F3 модуль: психотические и аффективные синдромы;
- в) F4/F5 модуль: невротические и поведенческие синдромы;
- г) F6 модуль: расстройства личности.

Для облегчения использования эти модули представлены на страницах различных цветов и заполняющий их специалист будет использовать только те модули, признаки которых обнаруживает данный больной.

Каждый из модулей содержит список симптомов и списки состояний, которые в соответствии с критериями МКБ-10 должны быть исключены или, наоборот, могут быть связаны с синдромом.

Эти списки сопровождаются инструкциями, которые могут помочь при рассмотрении других возможных синдромов и, соответственно, использования других модулей оценочного перечня.

Использование модулей также предполагает возможность учета (регистрации) начала, тяжести и длительности синдрома, а также количества эпизодов.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Специалист, использующий оценочный перечень, должен быть знаком с диагностическими критериями МКБ-10. Следующие шаги рекомендуются при его применении:

**Шаг 1:** запишите и закодируйте общую информацию на титульном листе.

**Шаг 2:** отметьте положительные (т. е. имеющиеся) симптомы, перечисленные в скринере (использовать V или X).

**Шаг 3:** используйте только те модули, по которым пациент был выделен.

**Шаг 4:** отметьте обнаруженные симптомы в используемых модулях (использовать V или X).

Для оценки длительности синдрома и количества эпизодов внесите соответствующее число в квадрат справа (например, 0,3).

**Шаг 5:** рассмотрите дифференциальные диагнозы или синдромы, согласно инструкции в модулях. При необходимости обратитесь к другим модулям.

**Шаг 6:** Закодируйте установленные диагнозы на титульном листе, используя F категории (например, F41.0).

**Шаг 7:** Отметьте степень уверенности в диагнозе на титульном листе (использовать V или X).

**Шаг 8:** Внесите любые примечания на титульный лист.

# ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Учреждение: \_\_\_\_\_ код

--	--	--	--

Исследование: \_\_\_\_\_ код

--	--	--	--

Врач: \_\_\_\_\_ код

--	--	--	--

Дата:

Больной: \_\_\_\_\_ код

--	--	--	--

Возраст:

--	--

Пол:

— мужчина

— женщина

МКБ-10 Диагноз (F — категория)

--	--	--	--	--

— основной

--	--	--	--	--

— вспомогательный

--	--	--	--	--

Степень уверенности в диагнозе:

— высокая

— средняя

— низкая

Примечания врача:

---

---

---

---

# FACE SHEET

Institution: \_\_\_\_\_ code:

Study: \_\_\_\_\_ code:

Clinician: \_\_\_\_\_ code:

Date:

Patient: \_\_\_\_\_ code:

Age:

Sex:

— Male

— Female

ICD-10 Diagnosis (F category):

— Principal

— Subsidiary

Diagnostic confidence:

— High

— Moderate

— Low

Clinician's notes:

---

---

---

---

# SCREENER СКРИНЕР

## РАСПОЗНАВАНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

- Психологические жалобы \_\_\_\_\_
- Соматические жалобы, не подтвержденные обследованием \_\_\_\_\_
- Поведение, отклоняющееся от культурально принятых норм \_\_\_\_\_
- Другие причины (объяснить): \_\_\_\_\_

*Если нет ничего, остановитесь*

- Социальные нарушения или нарушения занятости (трудоустрой) \_\_\_\_\_
- Сопутствующие соматические расстройства или состояния \_\_\_\_\_
- Психо-социальный стресс \_\_\_\_\_

## ПСИХО-ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И СИНДРОМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

- Снижение памяти или других интеллектуальных способностей \_\_\_\_\_
- Измененность сознания \_\_\_\_\_
- Прием психоактивных средств \_\_\_\_\_

*Если что-либо есть, используйте Модуль F0/F1:*

## ПСИХОТИЧЕСКИЕ И АФФЕКТИВНЫЕ СИНДРОМЫ

- Катоническое поведение \_\_\_\_\_
- Бред и галлюцинации \_\_\_\_\_
- Приподнятое, раздражительное или подозрительное настроение \_\_\_\_\_
- Сниженное или подавленное настроение \_\_\_\_\_
- Сниженное или подавленное настроение \_\_\_\_\_
- Социальная изоляция или снижение соц. функционирования \_\_\_\_\_

*Если что-либо есть, используйте Модуль F2/F*

## НЕВРОТИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ

- Фобия или тревога (паническая) \_\_\_\_\_
- Навязчивые мысли или действия \_\_\_\_\_
- Диссоциативные (конверсионные) состояния \_\_\_\_\_
- Анорексия или булимия \_\_\_\_\_
- Диссомнии или парасомнии \_\_\_\_\_
- Половые дисфункции \_\_\_\_\_

*Если что-либо есть, используйте Модуль F4/F*

## ЛИЧНОСТНЫЕ РАССТРОЙСТВА

- Длительно существующие девиации личностных черт или поведенческих стереотипов \_\_\_\_\_

*Если да, то используйте Модуль*

# МОДУЛЬ F0/F1:

## ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И СИНДРОМ ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

### ПСИХООРГАНИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

**А. Какие из следующих симптомов имеют место?**

1. Снижение памяти \_\_\_\_\_
2. Снижение других интеллектуальных функций \_\_\_\_\_
3. Нарушение эмоционального контроля, социального поведения или мотиваций \_\_\_\_\_
4. Нарушение сознания и внимания \_\_\_\_\_
5. Нарушение восприятия или дезориентировка \_\_\_\_\_
6. Психомоторные расстройства \_\_\_\_\_
7. Нарушение цикла сон—бодрствование \_\_\_\_\_
8. Острое начало и суточные колебания симптоматики \_\_\_\_\_

**В. Какова тяжесть (степень выраженности) данного синдрома?**

- легкая \_\_\_\_\_
- средняя \_\_\_\_\_
- тяжелая \_\_\_\_\_

**С. Какова длительность данного синдрома?**

- в днях \_\_\_\_\_
- в месяцах \_\_\_\_\_
- в годах \_\_\_\_\_

**Д. Какие из следующих состояний могут быть исключены?**

1. Умственная отсталость \_\_\_\_\_
2. Ятрогенное психическое заболевание как результат лечения \_\_\_\_\_

**Е. Какие из следующих состояний могут быть связаны с синдромом?**

1. Депрессивные симптомы \_\_\_\_\_
2. Миниакальные симптомы \_\_\_\_\_

*Если что-либо есть, рассмотри **аффективные синдромы***

3. Алкоголизм или наркомания \_\_\_\_\_  
— в качестве причины данного синдрома \_\_\_\_\_  
— сопутствующий данному синдрому \_\_\_\_\_

*Если что-либо есть, рассмотри **алкоголизм и наркоманию***

4. Личностные или поведенческие изменения \_\_\_\_\_

*Если да, рассмотри **синдромы личностных расстройств***



5. Острое или преходящее психотическое расстройство \_\_\_\_\_  
6. Острые состояния при шизофрении \_\_\_\_\_

*Если что-либо есть, рассмотри психотический синдром*

**F. Какой из следующих диагнозов имеет место?**

1. Деменция (F01—F03) \_\_\_\_\_

2. Делирий (F05) \_\_\_\_\_

3. Органическое личностное расстройство (F07) \_\_\_\_\_

*Если что-либо есть, выставить F код на Face sheet*

4. Другие органические психические заболевания:

— органический галлюциноз (F06.0) \_\_\_\_\_

— органическое кататоническое расстройство — ступор или возбуждение (F06.1) \_\_\_\_\_

— органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство (F06.2) \_\_\_\_\_

— органическое аффективное расстройство (F06.3) \_\_\_\_\_

— органическое тревожное расстройство (F06.4) \_\_\_\_\_

— органическое диссоциативное расстройство (F06.5) \_\_\_\_\_

— органическое эмоционально-лабильное расстройство (F06.6) \_\_\_\_\_

*При любом положительном ответе рассмотреть соответствующий модуль*

## **СИНДРОМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ**

**A. Какие из следующих симптомов имеют место?**

1. Сильное желание или непреодолимое стремление употреблять вещество («жажда») \_\_\_\_\_

2. Нарушенная способность контролировать употребление вещества («утрата контроля») \_\_\_\_\_

3. Употребление вещества с целью смягчения или избежания симптомов абстиненции \_\_\_\_\_

4. Состояние абстиненции \_\_\_\_\_

5. Толерантность (физиологическая, поведенческая или психологическая) \_\_\_\_\_

6. Сужение ассортимента употребляемых веществ \_\_\_\_\_

7. Прогрессивное сужение альтернативных удовольствий, форм поведения или интересов из-за предпочтения избранного вещества \_\_\_\_\_

8. Психологический или соматический вред вследствие употребления вещества \_\_\_\_\_

9. Постоянное употребление вещества, несмотря на очевидные доказательства его вредных последствий \_\_\_\_\_

**B. Длительность данного синдрома?**

— в месяцах \_\_\_\_\_

**С. Какие из перечисленных веществ употреблялись?**

- алкоголь \_\_\_\_\_
- опиоиды \_\_\_\_\_
- гашишеподобные \_\_\_\_\_
- снотворные \_\_\_\_\_
- кокаин \_\_\_\_\_
- стимуляторы (включая кофеин) \_\_\_\_\_
- галлюциногены \_\_\_\_\_
- табак \_\_\_\_\_
- растворители \_\_\_\_\_
- сочетание веществ или другие психоактивные вещества \_\_\_\_\_

**Д. Какие из следующих состояний связаны с данным синдромом?**

1. Делирий \_\_\_\_\_
2. Амнестический синдром \_\_\_\_\_

*Если что-либо есть, рассмотри психо-органический синдром*

3. Психотические симптомы \_\_\_\_\_

*Если да, рассмотри психотический синдром*

**Е. Какой из следующих диагнозов имеет место?**

1. Злоупотребление (F1x.1) \_\_\_\_\_

*Если да, укажите психоактивные вещества:*

---

2. Синдром зависимости (F1x.2) \_\_\_\_\_

*Если да, укажите психоактивные вещества:*

---

## МОДУЛЬ F2/F3:

### ПСИХОТИЧЕСКИЙ И АФФЕКТИВНЫЙ СИНДРОМЫ

#### ПСИХОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

##### A. Какие из следующих симптомов имеют место?

1. Звучащие мысли, вкладывание или отнятие, или трансляция мыслей \_\_\_\_\_
2. Бред или бредовое восприятие \_\_\_\_\_
3. Галлюцинаторные голоса или другие постоянные галлюцинации любой модальности \_\_\_\_\_
4. Разорванность, бессвязная речь или неологизмы \_\_\_\_\_
5. Кататоническое поведение \_\_\_\_\_
6. «Негативные симптомы» (апатия, обедненность речи, уплощение или неадекватность эмоциональных реакций) \_\_\_\_\_
7. Бесцельное или непоследовательное поведение \_\_\_\_\_
8. Обедненная невербальная коммуникация \_\_\_\_\_
9. Заметное снижение в социальной, школьной или профессиональной деятельности, социальная изоляция \_\_\_\_\_
10. Странная, эксцентричная или своеобразная манера одеваться, неряшливость \_\_\_\_\_
11. Переживание деперсонализации или дереализации \_\_\_\_\_
12. Эмоциональная хаотичность \_\_\_\_\_
13. Растерянность или неузнавание людей или мест \_\_\_\_\_
14. Повышенная или пониженная подвижность \_\_\_\_\_

##### B. Каково начало данного синдрома?

- острое \_\_\_\_\_
- хроническое \_\_\_\_\_

##### C. Какова длительность данного синдрома?

- в днях \_\_\_\_\_
- в месяцах \_\_\_\_\_

##### D. Какие из следующих состояний могут быть исключены?

1. Органическое заболевание головного мозга \_\_\_\_\_
2. Шизоидное личностное расстройство \_\_\_\_\_
3. (Суб)культуральное влияние особенностей выражения \_\_\_\_\_
4. Субнормальный (недостаточный) уровень интеллекта \_\_\_\_\_
5. Алкогольная или наркотическая интоксикация или абстиненция в качестве причины данного синдрома \_\_\_\_\_

##### E. Какие из следующих состояний могут быть связаны с синдромом?

1. Маниакальные симптомы \_\_\_\_\_

2. Депрессивные симптомы

Если что-либо есть, рассмотри **аффективные синдромы**

3. Злоупотребление алкоголем или наркотиками, сосуществующее с данным синдромом

Если да, рассмотри **синдром злоупотр. психоакт. веществами**

F. Какой из следующих диагнозов имеет место?

1. Шизофрения (F20)

2. Шизотипальное расстройство (F21)

3. Параноидное (бредовое) расстройство (F22)

4. Острое и преходящее психотическое расстройство (F23)

5. Шизоаффективное расстройство (F25)

Если что-либо есть, выставить F код на Face sheet

## МАНИЯ

A. Какие из следующих симптомов имеют место?

1. Ненормально повышенное или раздражительное настроение

2. Повышенная активность или физическое беспокойство

3. Повышенная говорливость (речевое давление)

4. Отвлекаемость или постоянное изменение планов и деятельности

5. Сниженная потребность в сне

6. Повышенная сексуальная энергия или сексуальная невожатанность

7. Дурашливое или другое безрассудное или безответственное поведение

8. Гиперсоциальность или сверхфамильярность

9. Ускоренное мышление или «скачка идей»

10. Повышенная самооценка или идеи величия

B. Какова тяжесть (степень выраженности) данного синдрома?

— гипоманиакальная

— маниакальная

C. Длительность данного синдрома?

— в днях

D. Сколько эпизодов уже было?

E. Какие из следующих состояний можно исключить?

1. Внезапное эндокринное расстройство

2. Неожиданный лекарственный эффект

3. Нервная анорексия \_\_\_\_\_
4. Шизофрения \_\_\_\_\_
- F. Какие из следующих состояний связаны с данным синдромом?**
1. Психоорганическое расстройство:  
 — вызвавшее данный синдром \_\_\_\_\_  
 — сосуществующее с данным синдромом \_\_\_\_\_  
*Если что-либо есть, рассмотри психоорганический синдром*
2. Депрессивные симптомы \_\_\_\_\_  
*Если да, рассмотри биполярное аффективное заболевание*
3. Постоянные колебания настроения \_\_\_\_\_  
*Если да, рассмотри циклотимию*
4. Злоупотребление алкоголем или наркотиками:  
 — вызвавшее данный синдром \_\_\_\_\_  
 — сосуществующее с данным синдромом \_\_\_\_\_  
*Если что-либо есть, рассмотри синдром злоупотр. психоакт. веществами*
5. Бред и галлюцинации \_\_\_\_\_  
*Если да, рассмотри шизоаффективное заболевание*
- G. Какой из следующих диагнозов имеет место?**
1. Гипомания (F30.0) \_\_\_\_\_
2. Мания без психотических симптомов (F30.1) \_\_\_\_\_
3. Мания с психотическими симптомами (F30.2) \_\_\_\_\_

## ДЕПРЕССИЯ

- A. Какие из следующих симптомов имеют место?**
1. Подавленное настроение \_\_\_\_\_
2. Утрата интереса или удовольствия \_\_\_\_\_
3. Сниженная энергия или повышенная усталость (утомляемость) \_\_\_\_\_
4. Утрата уверенности и самоуважения \_\_\_\_\_
5. Необоснованные самоупреки и неадекватное чувство вины \_\_\_\_\_
6. Суицидальные мысли и поведение \_\_\_\_\_
7. Затруднения в мышлении и концентрации внимания \_\_\_\_\_
8. (Объективная) психомоторная ажитация или заторможенность \_\_\_\_\_
9. Нарушение сна \_\_\_\_\_
10. Изменение аппетита и веса (5% веса тела) \_\_\_\_\_

11. Недостаточная реакция на события или деятельность \_\_\_\_\_
12. Утяжеление депрессии утром \_\_\_\_\_
13. Заметная утрата сексуального влечения (либидо) \_\_\_\_\_
14. Плаксивость \_\_\_\_\_
15. Чувство безнадежности или отчаяния \_\_\_\_\_
16. Неспособность справиться с повседневными обязанностями \_\_\_\_\_
17. Пессимизм в отношении будущего или чрезмерная погруженность в прошлое \_\_\_\_\_
18. Меньшая, чем обычно, разговорчивость \_\_\_\_\_
19. Депрессивный ступор (обездвиженность) \_\_\_\_\_
- В. Какова тяжесть (степень выраженности) данного синдрома?**
- легкая \_\_\_\_\_
- средняя \_\_\_\_\_
- тяжелая \_\_\_\_\_
- С. Длительность данного синдрома?**
- в неделях \_\_\_\_\_
- Д. Сколько эпизодов уже было?** \_\_\_\_\_
- Е. Какие из следующих состояний можно исключить?**
1. Внезапное эндокринное расстройство или лекарственная терапия \_\_\_\_\_
2. Шизофрения в качестве причины данного синдрома \_\_\_\_\_
- Ф. Какие из следующих состояний связаны с данным синдромом?**
1. Психорганическое расстройство \_\_\_\_\_  
*Если да, рассмотри психоорганический синдром*
2. Шизофрения, сосуществующая с данным синдромом \_\_\_\_\_  
*Если да, рассмотри шизофрению*
3. Гипоманиакальные или маниакальные симптомы \_\_\_\_\_  
*Если да, рассмотри биополярное аффективное заболевание*
4. Постоянная нестабильность настроения (более 2 лет) \_\_\_\_\_  
*Если да, рассмотри циклотимию*
5. Продолжительность синдрома менее двух недель \_\_\_\_\_  
*Если да, рассмотри кратковрем. и смешанные аффективные расстройства*
6. Бред и галлюцинации \_\_\_\_\_  
*Если да, рассмотри шизоаффективное заболевание*
7. Злоупотребление алкоголем или наркотиками: \_\_\_\_\_  
 — вызвавшее данный синдром \_\_\_\_\_

— сосуществующее с данным синдромом \_\_\_\_\_

*Если что-либо есть, рассмотри синдром  
злоупотр. психоакт. веществами*

**G. Какой из следующих диагнозов имеет место?**

1. Легкий депрессивный эпизод (F32.0) \_\_\_\_\_
2. Умеренный депрессивный эпизод (F32.1) \_\_\_\_\_
3. Тяжелый депрессивный эпизод без психотических  
симптомов (F32.2) \_\_\_\_\_
4. Тяжелый депрессивный эпизод с психотическими  
симптомами (F32.3) \_\_\_\_\_
5. Эпизод рекуррентной депрессии (F33.0) \_\_\_\_\_
6. Циклотимия (F34.0) \_\_\_\_\_
7. Дистимия (F34.1) \_\_\_\_\_
8. Биполярное аффективное расстройство (F31) \_\_\_\_\_

## МОДУЛЬ F4/F5:

### НЕВРОТИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ

#### НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

##### A. Какие из следующих симптомов имеют место?

1. Страхи \_\_\_\_\_
2. Приступы паники \_\_\_\_\_
3. Тревога, беспокойство, тревожные опасения \_\_\_\_\_
4. Симптомы вегетативной тревоги \_\_\_\_\_
5. Навязчивые мысли и компульсивные действия \_\_\_\_\_
6. Подверженность исключительным психическим, физическим или социальным стрессорам \_\_\_\_\_
7. Постоянные воспоминания или «переживания» стрессового воздействия \_\_\_\_\_
8. Избегание обстоятельств, связанных со стрессом \_\_\_\_\_
9. Признаки нарастающей психологической чувствительности или возбуждения \_\_\_\_\_
10. Диссоциативные (конверсионные) симптомы или состояния \_\_\_\_\_
11. Многочисленные и разнообразные физические жалобы, необъяснимые никаким соматическим расстройством \_\_\_\_\_
12. Повторные консультации с профессионалами (медиками) и упорный отказ следовать медицинским советам \_\_\_\_\_
13. Постоянная психическая и физическая усталость \_\_\_\_\_

##### B. Какова длительность данного синдрома?

- в неделях \_\_\_\_\_
- в месяцах \_\_\_\_\_

##### C. Какие из следующих состояний могут быть исключены?

1. Психотические симптомы или расстройства \_\_\_\_\_
2. Злоупотребление наркотиками или абстинентное состояние \_\_\_\_\_
3. Преднамеренная симуляция \_\_\_\_\_

##### D. Какие из следующих состояний могут быть связаны с синдромом?

1. Аффективные симптомы \_\_\_\_\_  
*Если есть, рассмотри аффективные синдромы*
2. Деперсонализационные и дереализационные переживания \_\_\_\_\_  
*Если есть, рассмотри психотический синдром*

##### E. Какой из следующих диагнозов имеет место?

1. Фобии (F40.0—F40.2) \_\_\_\_\_



2. Паническое расстройство (F41.0) \_\_\_\_\_
  3. Генерализованная тревога (F41.1) \_\_\_\_\_
  4. Смешанное или другие тревожные расстройства (F41.2—41.3) \_\_\_\_\_
  5. Обсессивно-компульсивное расстройство (F42) \_\_\_\_\_
  6. Острая стрессовая реакция (F43.0) \_\_\_\_\_
  7. Посттравматическое стрессовое заболевание (F43.1) \_\_\_\_\_
  8. Адаптационные расстройства (F43.2) \_\_\_\_\_
  9. Диссоциативные (конверсионные) расстройства (F44) \_\_\_\_\_
  10. Соматоформные расстройства (F45.0—F45.4) \_\_\_\_\_
  11. Неврастения (F48.0) \_\_\_\_\_
- Если что-либо есть, выставить F код на Face sheet*

### ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ

- A. Какие из следующих симптомов имеют место?**
1. Значительная потеря веса, вызванная самим больным \_\_\_\_\_
  2. Эпизоды обжорства \_\_\_\_\_
  3. Опасения поправиться (ожиреть) \_\_\_\_\_
  4. Эндокринологические последствия (амеоррея, импотенция) \_\_\_\_\_
  5. Качественные, количественные и временные нарушения сна \_\_\_\_\_
  6. Эпизоды непроизвольного подъема с постели и снохождение \_\_\_\_\_
  7. Эпизоды пробуждения от сна, сопровождаемые паническим криком и тревожными проявлениями \_\_\_\_\_
  8. Пробуждения вследствие пугающих сновидений с яркими воспоминаниями кошмара \_\_\_\_\_
  9. Нарушение сна, вызывающее значительный дистресс или препятствующее дневной деятельности \_\_\_\_\_
  10. Частовозникающая неспособность участвовать в сексуальных отношениях, не соответствующих собственному желанию \_\_\_\_\_
- B. Какова длительность данного синдрома?**  
— в месяцах \_\_\_\_\_
- C. Сколько эпизодов уже было?** \_\_\_\_\_
- D. Какие из следующих состояний можно исключить?**
1. Неврологическое или соматическое состояние, вызывающее данный синдром \_\_\_\_\_
  2. Предшествующая или продолжающаяся медикаментозная терапия, вызывающая данный синдром \_\_\_\_\_

**Е. Какие из следующих состояний связаны с данным синдромом?**

1. Депрессивное заболевание \_\_\_\_\_

*Если да, рассмотри **аффективный синдром***

2. Злоупотребление алкоголем или наркотиками \_\_\_\_\_

*Если что-либо есть, рассмотри синдром злоупотр. психоакт. веществами*

3. Психоорганическое расстройство \_\_\_\_\_

*Если есть, рассмотри **психоорганический синдром***

**Г. Какой из следующих диагнозов имеет место?**

1. Нервная анорексия (F50.0) \_\_\_\_\_

2. Нервная булимия (F50.2) \_\_\_\_\_

3. Нарушения сна неорганической природы (F51) \_\_\_\_\_

4. Сексуальные дисфункции неорганической природы (F52) \_\_\_\_\_

## МОДУЛЬ F6

### ЛИЧНОСТНЫЕ РАССТРОЙСТВА

#### A. Какие из следующих симптомов имеют место?

1. Давние и устойчивые личностные черты и формы поведения, отклоняющиеся от культурально принятых норм \_\_\_\_\_
2. Негибкое, неадаптивное или иное дисфункциональное поведение, перекрывающее широкий диапазон личностных и социальных ситуаций \_\_\_\_\_
3. Личностный дистресс или отталкивающее воздействие на социальное окружение \_\_\_\_\_

#### B. Какие из следующих черт и форм поведения имеют место?

##### 1. Параноидные:

- чрезмерная чувствительность к неудачам и отказам \_\_\_\_\_
- злопамятность в отношении обид и несправедливостей \_\_\_\_\_
- подозрительность \_\_\_\_\_
- стойкое и воинственное убеждение в собственных правах \_\_\_\_\_
- склонность к патологической ревности \_\_\_\_\_
- тенденция к переживанию чрезмерной собственной значимости \_\_\_\_\_
- поглощенность малосущественными событиями, интерпретируемыми в духе «заговора» \_\_\_\_\_

##### 2. Шизоидные:

- неспособность к переживанию удовольствия (ангедония) \_\_\_\_\_
- эмоциональная холодность, отчуждение или уплощенная аффективность \_\_\_\_\_
- слабая реакция как на похвалу, так и на критику \_\_\_\_\_
- слабый интерес к имеющемуся сексуальному опыту \_\_\_\_\_
- предпочтение фантазии, уединенной деятельности и интроспективной замкнутости \_\_\_\_\_
- отсутствие близких личных отношений \_\_\_\_\_
- затрудненное понимание и принятие социальных условностей (эксцентричность поведения) \_\_\_\_\_

##### 3. Диссоциальные:

- отсутствие способности к эмпатии \_\_\_\_\_
- безответственность и неуважение к социальным нормам \_\_\_\_\_

- неспособность к поддержанию продолжительных отношений \_\_\_\_\_
  - низкая фрустрационная толерантность и низкий порог для разрядки агрессии \_\_\_\_\_
  - неспособность к переживанию чувства вины \_\_\_\_\_
  - склонность к обвинению окружающих \_\_\_\_\_
  - постоянная раздражительность \_\_\_\_\_
4. Эмоционально лабильные:
- тенденция к неожиданным действиям без учета их последствий \_\_\_\_\_
  - тенденция к неуживчивому поведению и конфликтности \_\_\_\_\_
  - подверженность вспышкам гнева и насилия \_\_\_\_\_
  - отчетливая неспособность к планированию будущего или прогнозированию вероятности будущих событий \_\_\_\_\_
  - затруднения в поддержании какой-либо деятельности, которая не сулит немедленного вознаграждения \_\_\_\_\_
  - неустойчивое и капризное настроение \_\_\_\_\_
  - нарушения или неопределенность образа-Я и внутренних предпочтений (включая сексуальные) \_\_\_\_\_
  - склонность к вовлечению в интенсивные и неустойчивые отношения \_\_\_\_\_
  - повторные угрозы и акты самоповреждения \_\_\_\_\_
5. Истерические:
- самодраматизация, театральность \_\_\_\_\_
  - внушаемость \_\_\_\_\_
  - поверхностная и изменчивая аффективность \_\_\_\_\_
  - эгоцентричность \_\_\_\_\_
  - постоянное страстное желание быть высоко ценимым \_\_\_\_\_
  - стремление возбуждать к себе интерес или быть в центре внимания \_\_\_\_\_
  - манипулятивное поведение для достижения собственных выгод \_\_\_\_\_
6. Ананкастные (обсессивно-компульсивные):
- нерешительность \_\_\_\_\_
  - перфекционизм (стремление совершенствоваться) \_\_\_\_\_
  - сознательность (обязательность), скрупулезность \_\_\_\_\_
  - педантизм и конвенциональность \_\_\_\_\_
  - ригидность и упрямство \_\_\_\_\_
  - внезапное возникновение настойчивых и непреходящих мыслей или импульсов \_\_\_\_\_

- опережающее планирование любой деятельности в мельчайших деталях \_\_\_\_\_
- 7. Тревожные (избегающие): \_\_\_\_\_
  - ощущения напряжения и тревожного ожидания \_\_\_\_\_
  - рефлексия и чувство опасности и неполноценности \_\_\_\_\_
  - стремление нравиться и быть принятым \_\_\_\_\_
  - сверхчувствительность к отвержению и критике \_\_\_\_\_
  - отказ вступать в отношения, не гарантирующие абсолютного принятия \_\_\_\_\_
  - привычная склонность к преувеличению потенциальных опасностей или рискованности повседневных ситуаций \_\_\_\_\_
  - ограниченный жизненный стиль вследствие потребности в определенности и безопасности \_\_\_\_\_
- 8. Зависимые: \_\_\_\_\_
  - позволение другим брать на себя ответственность за основные сферы собственной жизни \_\_\_\_\_
  - полное подчинение тем, от кого субъект зависим \_\_\_\_\_
  - неспособность предъявлять требования людям, от которых зависим \_\_\_\_\_
  - восприятие себя как беспомощного, некомпетентного и недостаточно жизнеспособного \_\_\_\_\_
  - страх быть отвергнутым и постоянная потребность получать разуверения в отвержении \_\_\_\_\_
  - опустошенность и беспомощность, если близкие отношения кончены \_\_\_\_\_
  - возложение ответственности на других \_\_\_\_\_
- C. Какова длительность данного синдрома? \_\_\_\_\_
  - в годах \_\_\_\_\_
- D. Какие из следующих состояний можно исключить? \_\_\_\_\_
  1. Девиации вследствие иных психических заболеваний \_\_\_\_\_
  2. Девиации вследствие органических мозговых заболеваний или травм \_\_\_\_\_
- E. Какие из следующих состояний связаны с данным синдромом? \_\_\_\_\_
  1. Злоупотребление алкоголем или наркотиками \_\_\_\_\_
 

*Если есть, рассмотри синдром злоупотр. психоакт. веществами*
  2. Аффективные симптомы \_\_\_\_\_
 

*Если да, рассмотри аффективный синдром*
  3. Психотические симптомы \_\_\_\_\_
 

*Если да, рассмотри психотический синдром*

4. Невротические симптомы \_\_\_\_\_  
*Если да, рассмотри невротический синдром*
- G. Какой из следующих диагнозов имеет место?
1. Параноидное личностное расстройство (F60.0) \_\_\_\_\_
  2. Шизоидное личностное расстройство (F60.1) \_\_\_\_\_
  3. Диссоциальное личностное расстройство (F60.2) \_\_\_\_\_
  4. Эмоционально лабильные: \_\_\_\_\_
    - импульсивный тип (F60.30) \_\_\_\_\_
    - пограничный тип (F60.31) \_\_\_\_\_
  5. Ананкастное личностное расстройство (F60.6) \_\_\_\_\_
  6. Тревожное (избегающее) личностное расстройство (F60.7) \_\_\_\_\_
  7. Зависимое личностное расстройство (F60.7) \_\_\_\_\_
  8. Другие специфические личностные расстройства (F60.8) \_\_\_\_\_

ICD-F45