

# Ташкентская Медицинская Академия

## Особенности лечения пациентов героиновой наркоманией, осложненной соматической патологией.

Султанов Ш.Х. –ассистент кафедры психиатрии и наркологии,

Ходжаева Н.И.-профессор кафедры психиатрии и наркологии

## **АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.**

Учитывая неблагоприятную переносимость нейрорептиков и антидепрессантов у больных героиновой наркоманией, осложненной соматической патологией, встал вопрос о поиске препаратов, которые могли бы быть использованы в постабстинентном периоде с минимальными побочными осложнениями.

Цель исследования. В нашем исследовании препаратом выбора стал препарат цитофлавин, механизмы действия которого обсуждаются в литературе, где подчеркивается его эффективность, переносимость и безопасность.

***Афанасьев В.В. Цитофлавин в интенсивной терапии. Ст-Петербург, 2007***

По методу лечения все 34 больных героиновой наркоманией были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили 16 больных с соматической отягощенностью в комплексную терапию постабстинентных состояний которых был включен препарат цитофлавин. Остальные 18 больных с с соматической отягощенностью в комплексной терапии постабстинентных состояний получали стандартную терапию (СТ) и составили 2-ю группу.

- Препарат цитофлавин применялся нами в стандартной дозе по 10 мл на 200мл физ. раствора внутривенно капельно в течение 10 дней, затем по 2 таблетки 2 раза в день. Результаты исследования, показывают, что препарат цитофлавин оказывает положительное влияние почти на все симптомы постабстинентного состояния по сравнению с пациентами, леченых только стандартной терапией(дезинтоксикация,нейролептики,антидепрессанты)

- **Заключение.** Препарат цитофлавин обладает способностью подавлять компоненты патологического влечения к наркотикам, не вызывает сонливости и вялости, хорошо переносится, совместим со многими соматотропными препаратами, может быть применен для купирования постабстинентных расстройств больных героиновой наркоманией, осложненных соматической патологией.