

Патология ощущений и восприятия

Гиперестезия – повышенная чувствительность к раздражителям. Гипералгезия – усиление болевой чувствительности

Гипестезия – пониженная чувствительность к раздражителям
Обычные ощущения воспринимаются слабыми, тусклыми.
Анестезия – отсутствие чувствительности

Астения – патологическая усталость: повышенная утомляемость (физическая и психическая) после повседневных нагрузок, гиперестезия с раздражительностью и эмоциональной лабильностью, нарушения сна, вегетативные нарушения

Сенестопатии – тягостные ощущения, не имеющие для своего возникновения объективных причин (воспаления тканей).
Близко современному понятию нейропатическая боль

Психосенсорные расстройства - восприятие реально существующих предметов, пространства или собственного тела искаженными (метаморфопсия, аутометаморфопсия)

Метаморфопсия – искаженное восприятие: формы, размеров (макропсия и микропсия), пространственного расположения окружающих предметов

Аутометаморфопсия (расстройство схемы тела) – искаженное восприятие размера, массы тела, формы собственного тела

Дереализация – болезненное переживание измененности окружающего мира. *Deja vu* (дежавю, «уже виденное»), *Jamais vu* (жамевию, «никогда не виденное»)

Деперсонализация – болезненное переживание собственной измененности, измененности собственных психических процессов, собственного «Я»

Агнозия – утрата способности к узнаванию прежде знакомых объектов (при нормальном функционировании органов чувств)

Анозогнозия – неузнавание собственной болезни

Иллюзии – восприятие с неправильным узнаванием реальных объектов (невнимательности, афктогенные, парейдолические; слуховые, зрительные и пр.)

Парейдолические иллюзии – конфигурации линий (узоры, тени) на различных поверхностях претерпевают трансформацию, складываются в фантастические образы

Галлюцинации – расстройство восприятия в виде образов (представлений), произвольно возникающих без реального раздражителя и приобретающих для больного характер объективной реальности («мнимое восприятие», «восприятие без объекта»). Виды: истинные, псевдогаллюцинации; элементарные, простые, комплексные; зрительные, слуховые, вербальные (в т.ч. разл. по содержанию, вкл. императивные), тактильные, висцеральные, обонятельные, вкусовые; гипнагогические и гипнопомпические, функциональные (рефлекторные), психогенные (внушенные)

Галлюциноз - синдром, основным проявлением которого являются галлюцинации в одном из анализаторов (н., галлюциноз Шарля Бонне – при снижении зрения)

Патология мышления

Патологическая обстоятельность – чрезмерная детализация, застревание на частных обстоятельствах, деталей

Конкретное мышление – мышление ограничивается конкретными суждениями, абстрактное мышление недоступно

Резонёрство (рассуждательство) – пространное, абстрактное рассуждения, чрезмерно отвлеченные от своего непосредственного предмета

Символическое мышление – особый, отвлеченный, а иногда просто случайный смысл слов или событий

Неологизмы – новые слова, придуманные пациентом

Паралогическое мышление («кривая логика») – нарушение логических связей, логические ошибки, обусловленные односторонностью и тенденциозностью мышления больного, приводящие его к выводам, противоречащим действительности

Разорванное мышление – отсутствие логической связи между высказываниями, соединение разнородных, не связанных общим смыслом мыслей («в огороде бузина, а в Киеве – дядька»), грамматический строй речи сохранен

Бессвязное мышление (инкогерентное) – полное отсутствие логических и грамматических связей между словами. Речь больных бессвязная, беспорядочный набор отдельных слов, а также слогов и звуков

Стереотипное мышление – общее уменьшение гибкости мышления, проявляющееся в сложности изменения установок, повторяемости и обыденности мыслей

Персеверации – возвращения к мысли, которая уже была высказана ранее

Вербигерации – стереотипное, часто ритмичное повторение отдельных слов или звуков

Афазия – утрата прежде сформированной речи при поражении центров речи в коре головного мозга (сенсорная, моторная, амнестическая и пр.)

Алалия – отсутствие или недоразвитие речи у детей с сохраненным слухом

Мутизм – отказ от речи при сохранности речевого аппарата и корковых центров речи (например, при кататоническом ступоре и пр.)

А/дис-лексия – утрата/недоразвитие способности читать

А/дис-графия – утрата/недоразвитие способности правильно писать при сохранности двигательных функций

Эхолалия – бессмысленное повторение слов собеседника (например, при кататоническом возбуждении, слабоумии)

Бред - ложное, ошибочное суждение (не разделяется другими людьми), не поддается разубеждению, несмотря на явное противоречие действительности, овладевает всем сознанием больного (дисфункциональна). Фабулы: преследования, величия, самоуничижения. Систематизированный, отрывочный; малого размаха, мегаломанический; интерпретативный, чувственный, индуцированный; первичный, вторичный

Паранойяльный синдром – представлен систематизированным интерпретативным бредом без других продуктивных психопатологических расстройств

Параноидный синдром – представлен чувственным (преимущественно) бредом преследования

Синдром психических автоматизмов (Кандинского-Клерамбо): бред преследования и воздействия, псевдогаллюцинации, психические автоматизмы (чувство утраты контроля над собственными психическими процессами с бредовой интерпретацией существования этих процессов как вызванных внешним воздействием: идеаторные, сенсорные, моторные)

Парафренный: мегаломанический бред величия + прочие компоненты, свойственные с-му психических автоматизмов

Сверхценные идеи - правильные по своей сути идеи (с ними могут согласиться другие люди, хотя бы некоторые), получают в сознании индивида несоответствующую их реальному значению чрезмерную ценность, подчиняют себе жизнь человека (т.е. дисфункциональны)

Навязчивые явления - различные явления (мысли, сомнения, воспоминания, влечения, страхи и действия), произвольно возникают (без желания), есть критическое отношение (понимание болезненности/неправильности) или критическое отношение возможно в случае разубеждения, есть безуспешные попытки борьбы с ними (пытаются их «прогнать», но они снова возвращаются – навязываются)

Обсессии – идеаторные навязчивости (мысли, сомнения, воспоминания и пр.)

Компульсии – навязчивые действия (защитные, вкл. ритуалы, простые)

Фобии – навязчивые страхи

Нозофобии – страх заболеть тяжелой болезнью

(кардиофобия, канцерофобия, спидофобия, лиссофобия, мизофобия и пр.)

Агорафобия – страх открытых пространств, скопления людей, страх остаться без помощи. Приводит к избегающему поведению. Часто возникает в связи с паническими атаками

Панические атаки – непродолжительные приступы (обычно около 20-30 минут) выраженной тревоги с выраженными вегетативными расстройствами и страхом смерти или сумасшествия (потери контроля)

Социофобии – страх совершать какие-либо действия в присутствии других людей (выступить, привлечь внимание, покраснеть)

Простые (изолированные) фобии – самые разнообразные фобии (искл. нозофобии, агорафобию, социофобию), например, клаустрофобия, гипсофобия, аэрофобия и пр.

Ипохондрия - необоснованные или преувеличенные опасения за свое здоровье, поиск или уверенность в наличии у себя какого-либо заболевания при отсутствии его объективных признаков. М.б. навязчивая (нозофобии), сверхценная, бредовая

Дисморфофобия – навязчивый страх своего физического несовершенства + социофобия + сниженное настроение

Дисморфомания - бредовые или сверхценные идеи своего физического несовершенства + бредовые идеи отношения

Нарушения памяти и интеллекта

Гипермнезия – патологическое усиление памяти

Гипомнезия – патологическое ослабление (но не утрата) памяти или отдельных ее компонентов (затруднения с запоминанием новой информации, трудности с припоминанием имен и слов в нужный момент и пр.)

Амнезия - полная утрата памяти на события определенных промежутков времени (конградная – на период нарушения сознания, ретроградная – на события до нарушения сознания, антеградная –на события после восстановления сознания; фиксационная, прогрессирующая)

Фиксационная амнезия – утрата способности запоминать (фиксировать)

Прогрессирующая амнезия – последовательная полная утрата запасов памяти, идущая по закону Рибо (от настоящего к прошлому)

Псевдореминисценции — воспоминания о реально имевших место в жизни пациента событиях, которым неверно приписываются временные периоды, в которые они происходили

Криптомнезии — в качестве воспоминаний о событиях собственной жизни пациент принимает истории, услышанные от других людей, прочитанные в книгах, увиденные в кино или во сне

Конфабуляции — вымысел, принявший форму воспоминаний; рассказы пациентов о будто бы бывших с ними в прошлом событиях, которые на самом деле не могли с ними происходить

Амнестический (Корсаковский) синдром = фиксационная амнезия + антероградная амнезия, + (возможно) ретроградная амнезия + амнестическая дезориентировка + псевдореминисценции или конфабуляции

Апраксия - утрата способности выполнять произвольные целенаправленные действия при сохранности физических возможностей для их выполнения (т.е. при отсутствии параличей и пр.); утрата прежде сформированных бытовых и интеллектуальных навыков

Умственная отсталость – нарушение развития (формирования) интеллекта (причины действуют в возрасте до 3 лет), критерий IQ<70. Степени: легкая (дебильность), умеренная (легк.имбецильность), тяжелая (тяж.имбецильность), глубокая (идиотия)

Деменция – приобретенное слабоумие (снижение интеллектуальных способностей, достигающее степени нарушающей способность функционировать самостоятельно в повседневной жизни; необратимо, критерий длительности >6 мес) – легкая (парциальная), умеренная, тяжелая (тотальная)

Патология эмоций

Аффект - предельно выраженная эмоциональная реакция, возникающая при столкновении с экстремальными ситуациями («бей, беги или замри»). Патологический (сумеречное помрачение сознания), физиологический («состояние сильного душевного волнения»)

Тревога - эмоциональное состояние с беспредметным чувством близкого несчастья, надвигающейся катастрофы, внутреннего напряжения + повышение бдительности/настороженности, гиперестезия, нарушения сна, ускорение мышления + двигательное беспокойство + соматовегетативные проявления

Депрессия = гипотимия (болезненное снижение настроения) + идеаторная заторможенность) + моторная заторможенность

Тоскливая депрессия – все компоненты депрессивной триады + тоска (переживание потери, печали, горя), сниженная самооценка, идеи вины вплоть до бреда самоуничтожения + (возможны) «витальные» (соматические) признаки

Тревожная депрессия: депрессия + тревога; в триаде вместо заторможенности идеаторное и моторное возбуждение, характерно усиление симптоматики вечером. Переживания часто связаны с собственным здоровьем (ипохондрические идеи) или благосостоянием семьи (страх обнищания)

Апатическая депрессия: характерны жалобы на «апатию» – отсутствие эмоций, безучастность и безразличие к происходящему вокруг, но при депрессии это «отсутствие эмоций» обычно тягостно и чуждо больному (в отличие от апатии, как эмоционального свойства)

Маскированная депрессия - – депрессия, при которой собственно симптомы сниженного настроения скрываются (маскируются) какими-либо соматическими симптомами или другими психическими расстройствами (жалоб на сниженное настроение нет)

Мания - гипертимия (болезненно повышенное настроение) + повышенная идеаторная активность + повышенная двигательная активность + ↓ сна, ↑ влечений (полового, пищевого). Веселая, гневливая, гипомания

Эйфория – повышенное настроение без идеомоторного возбуждения, сопровождается чувством удовольствия, комфорта, расслабленности

Дисфория - приступы раздражительности, недовольства окружающими и самим собой; в основе гипотимия, сочетающаяся со злобой, тревогой и тоской

Эмоциональная лабильность – легкая изменчивость настроения по незначительным, сиюминутным причинам.

Выраженная степень: эмоциональная слабость

Эксплозивность (взрывчатость) – чрезмерная эмоциональная возбудимость с бурными вспышками аффектов ярости и гнева

Эмоциональная ригидность – тугоподвижность, вязкость эмоциональных переживаний, склонность к длительному переживанию чувств (особенно неприятных)

Эмоциональная амбивалентность — одновременное сосуществование противоположных эмоций

Эмоциональное огрубение — утрата высших (нравственных, эстетических, интеллектуальных и пр.) эмоций и чувств, тонких эмоциональных дифференцировок

Эмоциональная холодность — общий недостаток эмоциональности, уменьшение выраженности всех эмоций в виде ровного, равнодушного отношения ко всем происходящим событиям

Апатия — безразличие, полное отсутствие всех эмоций (в том числе биологически обусловленных), при котором не возникают желания и побуждения («ноль эмоций», «бодрствующая кома»)

Патология влечений и воли

Булимия – патологически усиленный, чрезмерный аппетит, неутолимое чувство голода, «прожорливость»

Анорексия – отсутствие чувства голода, утрата аппетита или преднамеренный отказ от пищи

Нервная анорексия – преднамеренное ограничение приема пищи ради снижения массы тела

Гиперсексуальность – усиление полового влечения

Гипосексуальность – снижение полового влечения

Парафилии - извращения полового влечения (эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия, принуждающий (насильственный) садизм, фроттеризм, другие парафилии, вовлекающие лиц без их согласия или вызывающие дистресс)

Импульсивность – склонность действовать по первому побуждению, под влиянием сиюминутных стимулов, влечений, без обдумывания и взвешивания альтернативных вариантов

Импульсивное влечение – внезапное сильное немотивированное влечение к запретной или неприемлемой для человека цели, которое почти сразу же реализуется без обдумывания («борьбы мотивов») и попыток ему противостоять [мотив – поиск риска]

Дипсомания – импульсивное влечение к употреблению алкоголя (без истинных симптомов зависимости)

Дромомания – импульсивное влечение к бродяжничеству, немотивированные уходы из дома

Пиромания – импульсивное влечение к поджогам

Клептомания – импульсивное влечение к краже предметов (ради риска, а не материальной заинтересованности)

Копролалия — импульсивное влечение произносить ругательства

Гипербулия – болезненно повышенная волевая активность

Гипобулия – болезненно пониженная волевая активность

Абулия – отсутствие волевой активности

Парабулии – извращение волевой активности, см.

«Кататонический синдром»

Кататонический синдром – психопатологический синдром, основным клиническим проявлением которого являются двигательные расстройства в виде состояний возбуждения и/или обездвиженности (ступора) с мышечным напряжением, которые носят немотивированный характер

Патология внимания и сознания

Общее угнетение процессов внимания - затруднение как фокусировки произвольного внимания, так и деятельности непроизвольного внимания; в основе снижение уровня бодрствования

Сверхотвлекаемость (гиперметаморфоз, сверхбодрствование) — фокусировка внимания сразу на всех действующих на человека стимулах, как на важных, так и на неважных.

Неустойчивость внимания (патологическая отвлекаемость) — неспособность человека удерживать фокус произвольного внимания на нужном ему объекте, в связи с чем страдает продуктивность его деятельности

Истощаемость внимания — неспособность человека длительное время удерживать фокус произвольного внимания

Тугоподвижность внимания (вязкость, патологическая прикованность) — трудности с переключением внимания с одной темы или объекта на другую тему или объект

Сужение объема внимания — возможность одновременно удержать в фокусе внимания лишь небольшое количество объектов

Выключение сознания - снижение уровня бодрствования, т.е. способности реагировать (сознательно) на происходящее вокруг, возможности активной умственной и физической деятельности. Степени: оглушение (есть речевой контакт, простые ответы или выполнения вербальных инструкций), сопор (есть реакция на боль), кома

Помрачение сознания – преходящее общее нарушение когнитивных процессов. Критерии К.Ясперса: Отстраненность от реальности (из-за отрывочности восприятия и понимания происходящего), дезориентировка, нарушение связности переживаний, амнезия периода нарушенного сознания

Делирий - наиболее частый вариант помрачения сознания, может возникать в ответ на любые внешние (экзогенные) вредности. Клиника: признаки помрачения сознания К.Ясперса + возможны (необязательны) иллюзии, истинные галлюцинации (часто зрительные) и вторичный бред + беспокойство, тревога, страх + состояния двигательного беспокойства, возбуждения + ундулирующее течение (ночью хуже). Варианты: «галлюцинаторное помрачение сознания» (выражены истинные зрительные, тактильные галлюцинации), спутанность (нет галлюцинаций), тяжелые формы (+ нарастание угнетения сознания): профессиональные, мусситирующий (бормочущий), аменция.

Онейроид - «сновидное», «грёзоподобное» помрачение сознания с наплывом фантастических сноподобных (псевдо)галлюцинаций, фантастическим чувственным бредом и двигательными расстройствами

Сумеречное помрачение сознания - внезапное возникновение и завершение (пароксизмальность), нарушение восприятия окружающего, после полная амнезия. Варианты: амбулаторные автоматизмы (автоматизированное поведение), галлюцинаторно-бредовое