




«Потребность в совершенствовании организации оказания наркологической помощи на фоне роста потребителей синтетических наркотиков»


Константинов Д.П., главный врач
СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»,
Куркова Е.С., зам. главного врача

Российская Федерация

**Количество
опийных
наркоманов
(тыс. человек)**



**Количество
наркоманов,
потребляющих
психостимуляторы
(тыс. человек)**




Динамика распространенности синдрома зависимости в Санкт-Петербурге

Синдром зависимости от ОПИОИДОВ




Синдром зависимости от ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ




Динамика первичной заболеваемости синдромом зависимости в Санкт-Петербурге




Синдром зависимости от ОПИОИДОВ



Синдром зависимости от ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ



Динамика структуры зарегистрированных лиц с диагнозом «Пагубное употребление наркотических средств» в Санкт-Петербурге



■ - психостимуляторы

■ - опиоиды

■ - каннабиноиды

■ - другие и сочетания

Возрастная структура в Санкт-Петербурге

Количество зарегистрированных больных		Всего (чел.)	из них жен.	Из общего числа лиц в возрасте					
				0-14 лет	15-17 лет	18-19 лет	20-39 лет	40-59 лет	60 лет и >
Синдром зависимости от опиоидов	<u>2020</u>	7193	2332				3006	4113	74
	<u>2015</u>	9368	2968			4	7323	1919	22

Количество зарегистрированных больных		Всего (чел.)	из них жен.	Из общего числа лиц в возрасте					
				0-14 лет	15-17 лет	18-19 лет	20-39 лет	40-59 лет	60 лет и >
Синдром зависимости от психостимуляторов	<u>2020</u>	695	164	1	8	5	516	161	4
	<u>2015</u>	372	87			4	307	60	1

Контингент пациентов круглосуточного стационара в Санкт-Петербурге



Нозологическая структура острых отравлений наркотическими средствами в Санкт-Петербурге*

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Героин	254	132	56	63	23
Метадон	927	1119	1182	1246	1130
Каннабиноиды	139	188	287	225	323
Другие и неустановленные наркотики и психодислептики (T40.4, T40.6, T40.9)	2160	2147	2336	2464	2736
ВСЕГО	3480	3586	3861	3998	4212

**> 60% - другие и
неустановленные
наркотические средства**




форма отчета не конкретизирует
новые синтетические вещества,
целесообразно
актуализировать перечень НС

* по данным центра отравлений НИИ СП им. Джанелидзе

Анализ сайта по сбыту наркотиков*

Продажи психоактивных веществ на Гидре в Санкт-Петербурге за неделю 03.08 – 03.15.2021

Количество обнаруженных отзывов в Санкт-Петербурге за изучаемый период времени на различные категории веществ




* по данным СО НКО


Анализ сайта по сбыту наркотиков*

Сравнение данных по Москве и Санкт-Петербургу

Сравнение общего числа отзывов и продаж по городам за изучаемую неделю



Сравнение долей рынка различных веществ в Москве и Санкт-Петербурге



* по данным СО НКО

Анализ сайта по сбыту наркотиков*

8-15 марта 2021 год


- ❑ Каждую минуту на Гидре создаётся ~100 сделок
- ❑ Каждый второй отзыв - это отзыв на **альфа-пвп** или **мефедрон**
- ❑ **Москва: 423** отзыва на ПАВ на 100 тыс. населения
Санкт-Петербург: 526 отзывов на ПАВ на 100 тыс. населения **(+24%)**
- ❑ Продажи синтетических каннабиноидов в Санкт-Петербурге по сравнению с Москвой при перерасчёте на 100 тыс. населения больше на 2050%

2 апреля 2021 год

- ❑ В России обнаружено более 127 000 моментальных адресов с НС.
При этом количество кладов, числящихся за одним адресом определить не возможно. По мнению исследователей сайтов настоящее количество кладов больше в 5-10 раз

Анализ сайта по сбыту наркотиков*

Количество моментальных адресов с психоактивными веществами на Гидре на 02.04.2021, ТОП-30 городов



4 адреса,
мефедрон

**Грозный, Чеченская
Республика, Республика
Дагестан:**
торговля через Гидру
практически не ведётся

Анализ сайта по сбыту наркотиков*

Количество сделок на Hydra

На графике изображено среднее количество ежедневных сделок, инициируемых покупателями на Hydra, по месяцам



* по данным СО НКО

Особенности новых видов синтетических психостимуляторов

(по данным клинического наблюдения в наркологической больнице Санкт-Петербурга)

- ☐ Крайне высокий наркогенный потенциал
- ☐ Большое разнообразие клинических проявлений
- ☐ Раннее появление обсессивного влечения к веществу (в первый-второй месяц употребления)
- ☐ Быстрый рост толерантности к веществу (преимущественно за счет учащения кратности приема)
- ☐ Частое развитие сопутствующих психических расстройств (интоксикационные психозы, расстройства тревожно-депрессивного, шизофренического спектров в постабстинентном состоянии)
- ☐ Выраженное повышение сексуального влечения, вплоть до расторможенности

Психические расстройства при употреблении новых синтетических психостимуляторов

(по данным клинического наблюдения в наркологической больнице Санкт-Петербурга)

Инттоксикационные психозы по психопатологической структуре протекают, как правило, в классических вариантах: делирий, параноид, онейроид, аффективные психозы (маниакальный, депрессивный, тревожно-агитированный и т.д.), галлюцинозы

Особенности психозов:

«вычурный характер» галлюцинозов,
нелепая фабула бредовых расстройств,
длительно сохраняющийся
резидуальный бред,
длительное **отсутствие критики** к
перенесенному психозу

«....да, это из-за наркотиков, но это голоса всех людей употребляющих мефедрон, собранные в одном месте, мы общаемся там.»

«.....цветные “ауры” в виде “развивающейся плазмы” вокруг людей, говорящие о характере и судьбе человека, которые впоследствии отделялись и начинали жить, как отдельные “сущности”

«...Пациент чувствует ползание под своей кожей. Внезапно решил, что это “нанороботы” Китайцев, которых подсыпают в “соли”, для сканирования” его организма и передачи данных в МВД.. Тщательно пытается отфильтровать в порошке “нанороботов”, иглой извлекает “жучки”».

«....Критика к переживаниям появилась только по прошествии 4 месяцев нахождения в стационарном реабилитационном отделении...»

Психические расстройства при употреблении новых синтетических психостимуляторов

(по данным клинического наблюдения в наркологической больнице Санкт-Петербурга)

Постабстинентные расстройства

Нарушения шизофренического спектра

- структурные нарушения мышления в виде соскальзываний и паралогий на фоне конкретности и обстоятельности
- обеднение мимики, снижение эмоционального резонанса
- парадоксальность эмоциональных реакций

...Поведение пациентки вызывало непонимание: мимика практически отсутствовала, была адинамична, периодически громко смеялась и нелепо улыбалась, когда ей задавались клинические, нейтральные вопросы...

проявления по мере купирования постабстинентных расстройств нивелируются, однако интуитивное ощущение наличия у пациента эндогенного расстройства у клинициста не проходит до конца

Аффективные расстройства

- тревожные
- депрессивные
- тревожно-депрессивные состояния


нередко достигают клинического уровня

	Тревога	Депрессия
Субклинический уровень, чел.	48 (49%)	36 (30%)
Клинический уровень, чел.	18 (18%)	7 (6%)
Обследовано, чел.	98	121

Особенности клинических проявлений при употреблении новых синтетических психостимуляторов

(по данным клинического наблюдения в наркологической больнице Санкт-/Петербурга)

- ☐ **Выраженное повышение сексуального влечения** вплоть до расторможенности
- ☐ **Употребление в ходе «Chem Sex Parties»** (активно практикующегося в среде потребителей современных психостимуляторов)
- ☐ **Внутривенный способ употребления**




↓ ↓

риск распространения ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем

1

Высокая латентность в категории потребителей новых синтетических психостимуляторов:

- расхождение официальной статистики зарегистрированных потребителей психостимуляторов и анализа данных по продажам сайтов
- потребители психостимуляторов не регистрируются низкопороговыми общественными организациями
- отсутствие выраженных соматических проявлений в абстинентном синдроме
- опасность роста ВИЧ и ЗППП



Имеется потребность :

- **Проведения популяционных исследований для изучения распространенности потребителей синтетических наркотиков**
- **Разработки новых механизмов привлечения наркопотребителей за специализированной помощью**

2

Отток пациентов в психиатрическую службу

2020, СПб	Наркологический стационар	Психиатрические стационары
Психотические расстройства вследствие употребления наркотических средств	7	113

- пациенты не попадают в число зарегистрированных наркологической службой
- сокрытие пациентами анамнеза потребления наркотиков – снижение эффективности терапии



- **Потребность в законодательном урегулировании информационного обмена в отношении социально значимых заболеваний**
- **Введение в стандарты оказания помощи по отдельным психиатрическим нозологиям химико-токсикологических исследований**

3

Увеличение сроков медицинской реабилитации

- необходимость дифференциальной диагностики с психическими расстройствами
- длительно сохраняющиеся резидуальные психические, тревожные расстройства
- длительное восстановление критики после перенесенных психозов
- рост средней продолжительности нахождения пациента в стационаре
- повторные госпитализации в реабилитационное отделение



- **Закрепить в стандартах сроки стационарной реабилитации в соответствии с клиническими рекомендациями для возможности проведения экономических расчетов пребывания пациента**

- **Исключить из алгоритма расчета показателя «повторные госпитализации» повторные госпитализации в реабилитационное отделение, как не связанные с рецидивом заболевания**



Благодарю за внимание!